Реакция окисления моно- и бис(гидразонотиоамидов)

Ю.А. Береговская*, Н.В. Барыкин, Н.П. Бельская

ФГАОУ ВПО УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
620062, Екатеринбург, ул. Мира, д. 28. E-mail: yulechka.beregovskaya@mail.ru

Исследована реакция окисления моно- и бис(гидразонов), содержащих первичную тиоамидную группу, синтезирован ряд моно- и бис(2,5-дигидротиадиазолов), изучены особенности строения полученных соединений спектральными методами.

Введение

Производные 1,2,3-тиадиазолов проявляют антибактериальные, антигрибковые, противовоспалительные, противогрибковые, анти-микробные, противовирусные, противовоспалительные, противоастматические свойства, применяются в сельском хозяйстве в качестве пестицидов, фунгицидов, биоцидов, микробиоцидов, гербицидов, дефолиантов¹. Широкий спектр направлений их практического использования делает актуальной разработку новых методов конструирования и получения новых моноциклических и полициклических производных этого гетероцикла, содержащих различные структурные фрагменты, которые способны моделировать физические и биологические свойства новых соединений.

Анализ литературных данных по методам синтеза 1,2,3-тиадиазолов и их химическим свойствам показал, что методы построения классической ароматической 1,2,3-тиадиазольной системы давно и широко изучены^{2,3}. В то же время, в литературе присутствуют лишь единичные примеры синтеза гидрированных или частично гидрированных 1,2,3-тиадиазолов⁴.

Особый интерес для получения 2,5-дигидропроизводных 1,2,3-тиадиазолов представляет реакция окислительной циклизации гидразонов с тиоамидной группой.

Важным преимуществом этого метода является использование простых и легкодоступных предшественников – гидразонов с тиоамидной группой, структура которых позволяет вводить в тиадиазольный цикл различные по электронным и пространственным эффектам заместители.

Результаты и обсуждение

Согласно литературным данным, удобными окисляющими агентами для гидразонотиоамидов являются галогены и галогенпроизводные, такие как: бром, йод, *N*-хлорсукцинимид (NCS), *N*-бромсукцинимид (NBS), и т.д. Использование окислителей на основе металлов не желательно, поскольку в этом случае происходит превращение исходных тиоамидов в карбоксамиды.

Окисление гидразонотиоамидов 1 *N*-хлорсукцинимидом 2 привело к образованию 2,5-дигидротиадиазолов 3 с умеренными и хорошими выходами (схема 1).

Схема 1

Данные элементного анализа указывают на то, что соединения **3** были выделены в виде 2,5-тиадиазолиминий хлоридов.

В результате реакции окисления бис(гидразонотиоамидов) **4** проведённой в аналогичных условиях (схема 2), были получены гидрохлориды бис(2,5-дигидротиадиазолов) **5**.

Схема 2

В спектрах ЯМР ^1H бис(2,5-дигидротиадиазолов) **5** наблюдается смещение сигналов протонсодержащих групп в слабое поле на 0.1...0.6 м.д. по сравнению со спектрами моно(2,5-дигидротиадиазолов) **3** (рис. 1).

Рис.1. Сравнение положений сигналов в спектрах ЯМР ^1H соединений **3b** (1) и **5c** (2). Это может быть связано с увеличением системы сопряжения в молекулах биспроизводных **5**.

В результате проведённого исследования было установлено, что окислительные превращения моно- и бис(гидразонотиоамидов) эффективно протекают в присутствии *N*-хлорсукцинимидов с образованием моно- и бис(2,5-дигидротиадиазолиминий) хлоридов.

Экспериментальная часть

Контроль за ходом реакции и индивидуальностью полученных веществ осуществляли с помощью ТСХ на пластинках Sorbfil Uf-254 в системах:

- 1) ацетон:хлороформ:гексан (1:2:1);
- 2) ацетон:хлороформ:гексан (1:2:2);
- 3) ацетон:этилацетат (1:2).

Спектры ЯМР ^1H получены на спектрометре «Bruker DRX-400» (400.00 МГц для ^1H), внутренний стандарт ТМС. Масс-спектры зарегистрированы на спектрометре SHIMADZU GCMS QP-2010 Ultra, энергия ионизирующих электронов 70 эВ с прямым вводом образца в источник.

Окисление моно(гидразонотиоамидов) **3**

Общая методика. К раствору 1 ммоль гидразона в 10 мл этилацетата добавляют 400 мг *N*-хлорсукцинимидов (3 ммоль) при охлаждении (5 °С). Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре. По завершению реакции (ТСХ, система №2,3), осадок фильтруют, промывают этилацетатом.

4-(Бензилкарбамойл)-2-фенил-1,2,3-тиадиазол-5(2H)-иминий хлорид. **3a.** Получено 153 мг, выход 44%. Оранжевый порошок, $t_{\text{пл}}$ 202-204 °С. $R_f=0.49$ (система №2). Спектр ЯМР ^1H (CDCl_3 , δ , м.д., $J/\text{Гц}$): 4.69 (шир. с, 2H, CH_2); 7.15 (с, 1H, CONH); 7.37-7.42 (м, 5H, $\text{CH}_2\text{-C}_6\text{H}_5$); 7.45-7.52 (м, 3H, $\text{NH-C}_6\text{H}_5$); 7.67 (шир. с, 2H, $\text{N-C}_6\text{H}_5$); 9.66 и 10.63 (с, 2H, NH^+). Для $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{ClN}_4\text{OS}$ найдено, %: С 56.02; Н 4.69; N 16.71; S 9.63. Вычислено, %: С 55.41; Н 4.36; Cl 10.22; N 16.15; S 9.24; O 4.61.

2-Фенил-4-(пирролидин-1-карбонил)-1,2,3-тиадиазол-5(2H)-иминий хлорид. **3b.** Получено 224 мг, выход 72%. Желтый порошок, $t_{\text{пл}}$ 252-254 °С. $R_f=0.66$ (система №1). Спектр ЯМР ^1H (DMSO-d_6 , δ , м.д., $J/\text{Гц}$): 1.84-2.02 (м, 4H, CH_2); 3.59 и 3.92 (т, 4H, $J_1=8$ Гц, $J_2=8$ Гц, N-CH_2); 7.51 (т, 1H, $J=7.4$ Гц, H_{Ar}); 7.61 (т, 2H, $J=7.52$ Гц, H_{Ar}); 7.76 (д, 2H, $J=8.36$ Гц, H_{Ar}); 10.02-10.46 (м, 2H, NH^+). Для $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{ClN}_4\text{OS}$ найдено, %: С 50.91; Н 5.35; N 18.87; S 9.79. Вычислено, %: С 50.24; Н 4.86; Cl 11.41; N 18.03; S 10.32; O 5.15.

Окисление бис(гидразонотиоамидов) **5**

Общая методика. К раствору 1 ммоль гидразона в 10 мл этилацетата добавляют 800 мг *N*-хлорсукцинимидов (6 ммоль) при охлаждении (5 °С). Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре. По завершению реакции (ТСХ, система

№3), осадок фильтруют, промывают этилацетатом.

2,2'-([1,1'-Бифенил]-4,4'-дидил)бис(4-(бензил-карбамоил)-1,2,3-тиадиазол-5(2H)-иминий) хлорид. 5a. Получено 153 мг, выход 61%. Чёрные кристаллы, $t_{пл}$ 266-268 °С. $R_f=0.36$ (система №3). Спектр ЯМР 1H (CDCl₃, δ , м.д., $J/Гц$): 4.72 (д, 4H, $J=5.8$ Гц, CONHCH₂); 7.30-7.81 (м, 18H, H_{Ar}); 9.61 (т, 2H, $J=5.8$ Гц, CONH) 9.73 и 10.67 (с, 4H, NH⁺₂). Для C₃₂H₂₈Cl₂N₈O₂S₂ найдено, %: С 55.1; Н 4.4; N 16.7; S 9.6. Вычислено, %: С 55.57; Н 4.08; Cl 10.25; N 16.20; O 4.63; S 9.27.

2,2'-(Метиленис(4,1-фенилен))бис(4-(бензилкарбамоил)-1,2,3-тиадиазол-5(2H)-иминий) хлорид. 5b. Получено 292 мг, выход 96%. Оранжевые кристаллы, $t_{пл}$ 195-197 °С. $R_f=0.41$ (система №3). Спектр ЯМР 1H (CDCl₃, δ , м.д., $J/Гц$): 4.04 и 4.14 (с, 2H, Ar-CH₂-Ar); 4.54 (д, 4H, $J=6.2$ Гц, CONHCH₂); 7.24-7.41 (м, 10H, H_{Ar}); 7.51 и 7.84 (AA'BB', 8H, $J=8.6$ Гц, H_{Ar}); 9.54 (т, 2H, $J=6.2$ Гц, CONH) 9.87 и 10.28 (с, 4H, NH⁺₂). Для C₃₃H₃₀Cl₂N₈O₂S₂ найдено, %: С 55.6; Н 4.6; N 15.1; S 9.2. Вычислено, %: С 56.17; Н 4.29; Cl 10.05; N 15.88; O 4.53; S 9.09.

2,2'-(Метиленис(4,1-фенилен))бис(4-(пирролидин-1-карбонил)-1,2,3-тиадиазол-5(2H)-иминий) хлорид. 5c. Получено 224 мг, выход 87%. Красно-коричневые кристаллы, $t_{пл}$ 214-216 °С. $R_f=0.40$ (система №3). Спектр ЯМР 1H (CDCl₃, δ , м.д., $J/Гц$): 1.96-2.16 (м, 8H, CH₂); 3.76 и 3.02 (т, 8H,

$J_1=7$ Гц, $J_2=7.1$ Гц, N-CH₂); 4.07 и 4.14 (с, 2H, Ar-CH₂-Ar); 7.36 и 7.64 (AA'BB', 8H, $J=8.3$ Гц, H_{Ar}); 10.02 и 10.22 и 10.84 (с, 2H, NH⁺₂). Для C₂₇H₃₀Cl₂N₈O₂S₂ найдено, %: С 50.9; Н 5.0; N 17.8; S 9.8. Вычислено, %: С 51.18; Н 4.77; Cl 11.19; N 17.69; O 5.05; S 10.12.

2,2'-(Оксибис(4,1-фенилен))бис(4-(бензил-карбамоил)-1,2,3-тиадиазол-5(2H)-иминий) хлорид. 5d. Получено 224 мг, выход 67%. Красно-коричневые кристаллы, $t_{пл}$ 260-262 °С. $R_f=0.38$ (система №3). Спектр ЯМР 1H (CDCl₃, δ , м.д., $J/Гц$): 4.70 (д, 4H, $J=5.2$ Гц, CH₂); 7.5 (шир. с, 1H, CONH); 7.12-7.21 (м, 4H, H_{Ar}); 7.32-7.45 (м, 10H, H_{Ar}); 7.67-7.74 (м, 4H, H_{Ar}); 9.72 и 10.60 (с, 4H, NH⁺₂). Для C₃₂H₂₈Cl₂N₈O₃S₂ найдено, %: С 54.5; Н 4.2; N 15.6; S 9.7. Вычислено, %: С 54.31; Н 3.99; Cl 11.02; N 15.83; O 6.78; S 9.06.

Библиографический список:

1. *The chemistry of 1,2,3-thiadiazoles*, V.A. Bakulev, W. Dehaen. *John Wiley & Sons*, Chichester, **2004**, 241 pp;
2. M. Al-Smadi, S. Ratrou // *Molecules*, **2004**, 9, 957-967.
3. Н.Р. Braun, Н. Meier. // *Tetrahedron*, **1975**, 31, 637-641.
4. А.И. Bolgova, К.И. Lugovik, J.O. Subbotina, P.A. Slepukhin, V.A. Bakulev, N.P. Belskaya. // *Tetrahedron*, **2013**, 69, 7423-7429.