Реагенты и условия: а) $(\text{COCl})_2$, CH_2Cl_2 , 20 °С; б) $\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, CH_2Cl_2 , 20 °С; в) CS_2 , Et_3N , EtOH , кипячение; г) 10 % H_2SO_4 , H_2O ; д) PhCH_2Cl , K_2CO_3 , ацетон, 20 °С; е) PhCH_2NCS , MeOH , 20 °С; ж) $\text{Hg}(\text{OAc})_2$, MeOH , кипячение; з) $\text{ClCH}_2\text{COOEt}$, KI , K_2CO_3 , DMCO , 20 °С; и) $\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, EtOH , кипячение; к) SOCl_2 , CH_2Cl_2 , Py , 20 °С; л) 2-(хлорметил)-5-фенил-1,3,4-оксадиазол, KI , K_2CO_3 , ацетон, 20 °С.

Список литературы

1. *Salahuddin, Mazumder A., Shahar Y. M., Mazumder R., Chakraborty G. S., Ahsan M. J., Ur Rahman M.* Updates on synthesis and biological activities of 1,3,4-oxadiazole: a review // *Synth. Commun.* 2017. Vol. 47, № 20. P. 1805–1847.
2. *Popov S. A., Semenova M. D., Baev D. S., Frolova T. S., Shults E. E., Wang C., Turks M.* Synthesis of cytotoxic urs-12-ene- and 28-norurs-12-ene- type conjugates with amino- and mercapto-1,3,4-oxadiazoles and mercapto-1,2,4-triazoles // *Steroids.* 2020. Vol. 153. P. 108524.

УДК 547.8

А. Д. Зиновьева, П. А. Политова

*Российский университет дружбы народов,
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6,
anna.zinovieva96@gmail.com*

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ТИЕНО[2,3-G]ИНДОЛИЗИНОВ*

Ключевые слова: 4-ароил-6,7-дигидротиено[3,2-с]пиридины, 4,5-дигидротиено[2,3-g]индолизины, домино-реакции.

Хорошо известно, что индолизины являются важным классом гетероциклических соединений, способных проявлять разнообразную биологическую активность [1]. Аннелированные тиофены, имеющие фрагменты с атомом азота в своем составе, содержатся в биологически активных соединениях [2]. Поэтому разработка современных способов получения тиеноиндолизинов привлекает интерес исследователей.

Так, был разработан метод синтеза исходных 4-ароил-6,7-дигидротиено[3,2-с] пиридинов **1**, который включает в себя несколько стадий. Далее были изучены домино-реакции получения тиеноиндолизинов с участием ряда α,β -непредельных альдегидов и алкинов, содержащих электронодефицитные группы.

При взаимодействии тиенопиридинов с α,β -непредельными альдегидами, такими как акролеин, кротоновый и коричный альдегид, образуются

формилзамещенные тиеноиндолизины **2** со средними выходами. Реакции проводили в трифторэтаноле при 150 °С в условиях микроволновой активации.

В трехкомпонентных реакциях с метилпропиолатом в спиртах (этанол, трифторэтанол) были получены 9-арил-4,5-дигидротиено[2,3-*g*]индолизин-8-карбоксилаты **3** с умеренными выходами. Условия реакции были оптимизированы с помощью введения катализатора и микроволновой активации.

В реакциях с симметричными алкинами при кипячении в толуоле образуются тиено[2,3-*g*]индолизины **4** с геминальным расположением функциональных групп. Продукты **4** выделяют с помощью колоночной хроматографии со средними выходами.

Таким образом, разработан метод получения тиеноиндолизинов из простых соединений. Для одного из соединений **4** приведены данные РСА.

Рисунок. Данные РСА для соединения **4** (R=H, X=CO₂Me)

Список литературы

1. Zhang Q., Tu G., Zhao Y., Cheng T. // *Tetrahedron*. 2002. Vol. 58. P. 6795–6798.
2. Lisowski V., Léonce S., Kraus-Berthier L., Sopková-de Oliveira Santos J., Pierré A., Atassi G., Caignard D. H., Rault S. // *Journal of Medicinal Chemistr.* 2004. Vol. 47 (6). P. 1448–1464.

* Работа выполнена при поддержке при поддержке Программы РУДН «5–100», гранта РФФИ № 17-53-54001_Вьет_а и гранта VAST № QTRU01.02/19-20.